



יחטוי: בירמטין (25:27 תסיס: טראנס איזמיר) 1%
 מסתחצר لمكافحة الطفيليات الخارجية على الطيور البيضاء.
 معالجة لمدة واحدة تبيد القمل، قش الطيور الشمالي، الاستوائي
 وفش الريش
 يحتوي: 1 كغم انظر بتمعن التعليمات قبل استعمال المستحضر
 رخصة الخدمات البيطرية لوزارة الزراعة رقم 243
 للاستعمال البيطري فقط ليس للاستعمال البיתי
تذيرات للانسان: قد يؤدي الى حساسية زائدة بالتلامس مع الجلد.
مسائل الحذر والوقاية: عند التغيير ارتدي كشوف واقية مصنوعة من
 نيوفران (بحسب معيار EN 374/3). ملابس واقية (ملايس عمل
 طويلة، حذاء مغلق) وكمامة وجه كاملة (بحسب معيار EN-136)
 مع فلتر (بحسب معيار EN -14387) من نوع P3.
 ممنوع الأكل والشرب او التدخين اثناء التغيير.

عند الانتهاء من التغيير اغسل يديك وأجزاء الجسم المكشوفة واغسل ملابس العمل منفردة عن الغسيل العام.
مخاطر على البيئة: سام للخلل سام للأسماك والكائنات الحية بالماء، يمنع الرش بجانب مصادر المياه.
تعليمات الاستعمال: امسك الطير، انثر المسحوق بانثر للغبار او باليدين المحمية بالكشوف على مكان وجود
 الحشرات - على فتحة الأبراز وحت جحان الطير بمقدار 10-15 غرام مستحضر للطير. حسب الأفة تبعا
 للائحة الاستعمال.


نوع الطفيل	مكان تواجد الطفيل	المقدار	ملاحظات
القمل	فتحة الأبراز عند الطير	طيور بياضة: ما يقارب 10 غم للطير	علاج واحد بمنطقة فتحة الأبراز.
فش الطير الشمالي والاستوائي فش الريش	منطقة الجناحين	علاج واحد على جميع اجزاء الطير.	
القمل الأحمر	في النهار: في الأقفاص المعدة للبيض.. جدران المبنى والأرضية. في الليل: على الطيور	قبل ادخال فوج جديد. يجب تغيير الأقفاص ب 10 غم للقفص. وذلك بعد اتباع التعليمات المذكورة في الملاحظات.	
القمل	بأجزاء مختلفة من جسم الطير	طيور بياضة: 10 غم للطير	يجب اعادة العلاج بعد 10-14 يوم

مدة الانتظار قبل تسويق البيض: 24 ساعة بعد التنفيذ.

تخزين: يجب تخزين المستحضر في عبوته الأصلية في مكان مظلل. مقفل. مخصص لتخزين مستحضرات
 كيميائية. ابعده عن متناول ايدي الاولاد وأناس آخرين والذين غير مخولين لاستعمال المستحضر.
التصرف بالعبوات الفارغة: يجب ثقب العبوة، تغليفها بالنابلون والقائها في النفايات.
اسعاف اولي ومعلومات للطبيب: في حال التلامس مع الجلد- اغسل جيدا بالصابون وبكميات كبيرة من الماء لمدة
 10 دقائق على الأقل. عند الحاجة توجه للمعالجة الطبية.
 في حال التلامس مع العينين: اغسل فوراً بالماء لمدة 15 دقيقة على الأقل (العين مفتوحة) توجه للمعالجة الطبية.
 في حال البلع- امتنع عن التسبب بالتقيؤ. اذا كان المصاب بحالة الوعي. اسقه الماء. انقله للمعالجة بأقرب فرصة.
 يمنع اسقاء مصاب فاقد للوعي. في حال الاستنشاق- انقل المصاب من موقع تعرضه للتغيير لمكان مهوياً. ساعد
 المصاب ليجلس/ يستلقي بشكل مريح. اذا كان المصاب يستصعب التنفس. اجلسه منتصباً واذا أمكن امنحه
 اكسجين. اذا كان المصاب فاقد للوعي. نفذ عملية انعاش. انقله فوراً للمعالجة الطبية.
 لمعلومات اضافية، المركز القطري للاستشارة الطبية بالتسمم، مستشفى رمبام، حيفا. هاتف: 04-8541900.
 في حالة نقل المصاب للمعالجة الطبية يجب عرض هذه اللائحة على الطبيب.

يمنع استعمال المستحضر بعد الموعد الاخير للاستعمال الظاهر على العبوة
 الخدمات البيطرية يقررون بأن الاستعمال الخاطئ، والذي ليس بحسب تعليمات اللائحة، قد يؤدي لاصابة
 المستخدم، الحيوانات، خطر على صحة الجمهور والبيئة والتي تعتبر مخالفة للقانون.

المنتج تاريخ انقضاء مفعول المستحضر: ريمي لوقاية النباتات ص.ب. 4002 بيتح كفا 4959404
 رقم الوجبة: تلفون: 03-9221551، فاكس: 03-9221550
 ريمي RIMI
 SINCE 1922



מכיל: פרמטרין (25:25 ציס: טרנס איזומר) 1%
 אבקה לקטילת טפילים חיצוניים בתרנגולות מטיול
 טיפול חד פעמי קוטל כינים, קרדית העוף הצפונית,
 הטרונית וקרדית הנוצה.
 מכיל 1 ק"ג קרא בעיון את הוראות לפני השימוש בתכשיר
 ברשיון השרותרים הווטרנריים במשרד החקלאות מס' 243.



אסור לשימוש ביתי
לשימוש וטרנרי בלבד

אזהרות לאדם: עלול לגרום לרגישות יתר במגע עם העור.
אמצעי בטיחות ומינון: בזמן האיבוק לבש כפפות עשויות נאופרן
 (לפי תקן EN-374/3), בגדי מגן (בגדי עבודה ארוכים, גלילים
 סגורות) ומסכת פנים מלאה לפי תקן (EN-136) עם מסנן לפי תקן
 (EN-14387) מסוג P3. אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן האיבוק.
 עם גמר האיבוק רחץ ידיים וחלקי גוף חשופים וכבס את בגדי
 העבודה בנפרד מהכביסה הכללית.
סיכונים לסביבה: רעיל לדבורים. רעיל לדגים וליצורים החיים
 במים, אין לרסס ליד מקווי מים.

הוראות השימוש: החזק את העוף, פזר את האבקה במאבק או בידיים מוגנות בכפפות במקום הימצאות המזיקים-
 אזור הביב ומתחת לכנפיים של העוף בכמות של 10-15 גרם תכשיר לעוף, בהתאם למזיק ולפי טבלת השימוש.

סוג הטפיל	מיקום הטפיל	מינון	הערות
קרדיות קרדית העוף הצפונית והטרופית	איזור הביב של העוף	עופות הטלה: כ-10 גרם לעוף	טיפול אחד באזור הביב
קרדית הנוצה	איזור הכנפיים של העוף		טיפול אחד על כל העוף
הקרדית האדומה	ביום: בתאי ההטלה, קירות המבנה והרפד בלילה: על העופות	לפני הכנסת להקה חדשה יש לאבק את תאי ההטלה כ-10 גרם לתא רק אחרי שמבצעים את הפעולות המצוינות בהערות	
כינים	בחלקי הגוף השונים של העוף	עופות הטלה: כ-10 גרם לעוף	יש לחזור על הטיפול כעבור 10-14 יום.

זמן המתנה לפני שיווק ביצים: 24 שעות לאחר היישום.
אחסון: יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במקום מוצל, געול, מיועד לאחסון תכשירים כימיים, הרחק מהישג
 ידם של ילדים ואנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.
טיפול באריזות ריקות: יש לקרוע את האריזה, לעטוף בניילון ולהשליך לפח האשפה.
עזרה ראשונה ומידע לרופא: במקרה של מגע בעור - שטוף עם סבון וכמויות גדולות של מים במשך 10 דקות לפחות.
 במידת הצורך הפנה לטיפול רפואי.

במקרה של מגע בעיניים - שטוף מיד במים במשך 15 דקות לפחות (עניינם פקוחות) והפנה לטיפול רפואי.
 במקרה של בליעה- אין לגרום להקאה. אם הנפגע בהכרה, השקה במים. הפנה לטיפול בהקדם האפשרי. אין להשקות
 נפגע חסר הכרה.
 במקרה של שאיפה - פנה את הנפגע מאתר החשיפה לאזור מאוורר. הושב/השכב את הנפגע במנוחה. אם הנפגע
 מתקשה בנשימה, הושיבו זקוף ובמידת האפשר תן חמצן. אם הנפגע חסר הכרה, בצע החייאה. הפנה מיד לטיפול
 רפואי.

למידע נוסף, המרכז הארצי ליעוץ רפואי בהרעלות, ב"ח רמב"ם, חיפה, טלפון 04-8541900.
 במקרה של פינוי לעזרה רפואית יש להציג תווית זו לרופא.



אין להשתמש בתכשיר לאחר התאריך האחרון לשימוש המופיע על גבי האריזה.
 השירותים הווטרנריים קובעים ששימוש לא נכון בתכשיר, שלא על-פי הוראות התווית, עלול לפגוע
 במשתמש, בבעלי החיים, מסוכן לבריאות הציבור ולסביבה ומהווה עבירה על החוק!

היצרן תאריך תפוגה של התכשיר: להגנת הצומח והסביבה בע"מ RIMI
 SINCE 1922
 ת.ד. 4002 פתח-תקוה 4959404, טל. 03-9221551, פקס. 03-9221550
 שרות לקוחות: cs@rimi.co.il, www.rimi.co.il