

הוראות השימוש

פירוטכניקה CP מיועד לתיקון חוסר ברזל בריסוסי עלווה ללא צורך במשטח. יתרונו בכך שאינו פוצע את העלה. שימוש בפירוטכניקה מיועד לצמחים הסובלים ממלרוזה. כללי: נפח תרסיס במטעים 300-50 ליטר לדונם בהתאם לגודל העץ. בשאר הגידולים: רסס פירוטכניקה CP בנפח תרסיס מומלץ, לכיסוי כל חלקי הצמח עד נגיעה. כדי לקבל כיסוי טוב יותר מומלץ להשתמש בפומיות היוצרות טיפות קטנות. יש לדאוג לערבול במיכל המרסס כל עת הריסוס. מומלץ לרסס בשעות הבוקר המוקדמות או לקראת ערב. יש להימנע מריסוס בימים בהם הטמפרטורה צפויה לעלות מעל 30°C.

אזהרות לאדם: התכשיר מסוכן בבליעה. התכשיר עלול לגרום לריגוש ולגירוי קל בעור ובנשימה. התכשיר עלול לגרום לגירוי בעיניים.

אזהרות וסכנות לסביבה: התכשיר עלול לגרום לנזק לסביבה מימית. יש להימנע לחלוטין מהגעת התכשיר או מי השטיפה של המרסס לברכות דגים ומקורות מים. התכשיר אינו רעיל לדבורים.

אמצעי זהירות ומיגון: בעת הטיפול יש לנהוג על פי כללי הזהירות בשימוש בחומרי הדברה ולהמנע מבליעה, נשימת הרחף ומגע של החומר עם העור הגלוי והעיניים. אין לשתות, לאכול או לעשן בזמן הטיפול. יש להשתמש במסכה P3 להגנה על דרכי הנשימה. השימוש בבגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים וגם נעלי עבודה סגורות, כובע, כפפות עמידות לכימיקלים (לפי תקן EN-374/3), משקפי מגן אטומות (לפי תקן EN-166), ומסכת חצי פנים (לפי תקן EN-140) עם מסנן מסוג ABEK-P3 (לפי תקן EN-14387).

אופן הכנת התרסיס: מלא את מיכל המרסס עד כדי מחצית במים, הוסף את הכמות הדרושה של פירוטכניקה CP והשלם את יתרת המים תוך כדי בחישה.

גידול	פגע	מינון	ימי המתנה	הערות
אפרסמון	מחסור בברזל	0.3%	3 ימים	עד נגיעה
מנגו				
עגבניה				
אגוזי אדמה				
פלפל				
כרם				
הדרים				

* בעצמי צעירים אין מגבלה למועד הריסוס, במרווח של 14 יום.
** לא ליישם בתנאי אקלים קיצוניים או לפניהם.



מכיל: 38% Iron Citrate

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי
ليس للاستعمال المنزلي - للاستعمال الزراعي

זהירות!

יש לקרוא את תווית לפני השימוש

יש לשמור את המוצר נעול ומוחזק להישג ידם של ילדים

מס. או"ם: לא מסווג

מכיל 10 ליטר

מס' אצווה:



מפיץ בלעדי:



מס. ת.ד. 4002 פתח-תקוה 4959404
טל. 03-9221551, פקס. 03-9221550
שרות לקוחות: 03-9221551
www.rimi.co.il

AG-00-0525-0000-F

בגמר היישום

ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס על כל חלקיו במים ופחם פעיל או דטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות מממתקן הריסוס, ממכיל איסוף או מממתקן אחר על הקרקע, אל בריכות דגים ומקווי מים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידי ופינוי לאחר פסולת רעילה ברמת חובב.

הגנה אישית: עם גמר הטיפול יש לרחוץ היטב את הגוף, בפרט את החלקים שהיו גלויים בעת הריסוס ולהחליף בגדים. יש לכבס בנפרד את בגדי העבודה. **כניסה מחדש:** ניתן להיכנס לשטח המטופל לאחר התיבשות מוחלטת של התרסיס, כשעה לאחר הריסוס. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

אחסון: יש לשמור את התכשיר באריזה המקורית במקום סגור, מוצל ונעול המיועד לאחסון חומרי הדברה הרחק ממוצרי מזון ומספוא ומהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.

טיפול באריזות ריקות: יש לשטוף היטב את האריזות ולהוסיף את מי השטיפה למי הריסוס במיכל המרסס. יש לנקב את תחתית ודפנות האריזה הריקה, למעון ולהשליך לפח האשפה.

עזרה ראשונה: במקרה של הרעלה, כתוצאה משימוש לא נכון בתכשיר, יש להשכיב את הנפגע במקום מוצל ומאוורר ולדאוג לקבלת עזרה מיידית ע"י רופא. במקרה של מגע החומר **בעיניים** יש לשטוף במים זורמים במשך 15 דקות. במידה וישנו גירוי מתמשך בעיניים, יש לפנות לרופא המטפל ולהביא את תויות התכשיר.

מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות ביה"ח רמב"ם טלפון: 04-7771900

הודעה: אין להשתמש בתכשיר לשימוש שאינו רשום בתווית לרבות ההגבלות, גידולים שאינם רשומים בתווית, זנים חדשים, בתנאי מזג אוויר קיצוניים ובתנאי שימוש בלתי רגילים.