

רימילור סס הנמר

לבלבול זכרי סס הנמר

מכיל: 155 מ"ג נדיפית: 3,13-octadecadienyl acetate-(E) 4% ו- 2,13-octadecadienyl acetate-(E) 96%

דרגת רעילות: מסוכן (דרגה IV) **מס' או"ם:** לא מסווג

רישיון השרותים להגנת הצומח מס: 4454/הצ/2018
רישיון לחקלאות אורגנית: 7527/הצ/2019

תאריך עדכון התווית: 7/2024



יצרן:



מכיל: 100 נדיפיות

מס' אצווה:

ספרד

להגנת הצומח
והסביבה בע"מ



ת.ד. 4002 פתח-תקוה 4959404, טל. 03-9221551, פקס. 03-9221550
שרות לקוחות: cs@rimi.co.il www.rimi.co.il

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

בעל הרישיון ומפיץ בלעדית:

כללי: רימילור סס הנמר הינה נדיפית, המכילה פרומון, לבלבול זכרי סס הנמר. הפרומון שמתנדף גורם לזכרי סס הנמר לאובדן התמצאות במציאת הנקבה ועקב כך להפחתה בהזדווגויות בשטח המטופל.

הוראות שימוש:

אזהרה: מסוכן בבליעה.

אמצעי זהירות ומיגון: נהג בתכשיר בכל אמצעי הבטיחות הנהוגים בעת הטיפול בחומרי הדברה מסוגו. לבש בגדי עבודה ארוכים, משקפי מגן (לפי תקן EN-166), וכפפות PVC או ניטריל (לפי תקן EN-374/3). אל תאכל, תשתה ותעשן בזמן העבודה. שמור הרוחק מהישג ידם של ילדים.

סכנות לסביבה: מסוכן ליצורים שוכני מים. אינו רעיל לדבורים.

אופן השימוש:

הגידול	המזיק	מספר נדיפיות לדונם
תפוח, זית	סס הנמר	30

יש לתלות את הנדיפיות בשליש העליון של הצמח, בצל, כשהן מוגנות מפגעים מכאניים כגון כלים חקלאיים או רוח. יש לנטר לנגיעות בעצים במהלך העונה ולשלב עם שיטות הדברה נוספות, באם יש נגיעות, בהתאם להוראות פקח מזיקים מורשה. יש לתלות את הנדיפיות מיד עם תחילת תעופת הבוגרים של הדור הראשון בשטח המטופל או בסביבתו. התכשיר יהיה יעיל במשך 130-150 יום. באזורים החשודים כנגועים באוכלוסיית סס הנמר גבוהה ובחלקות בעלות סיכון לנגיעות יש להשתמש, במידת הצורך, בכל האמצעים והתכשירים האפשריים בנוסף לרימילור סס הנמר. הפחתת האוכלוסייה תאריך מספר שנים בשימוש רציף בתכשיר, בנוסף לשיטות הדברה נוספות. את הנדיפיות יש לתלות באופן אחיד בכל החלקה, לפי הכמות הנקובה בטבלה. בנוסף, בעצי השוליים יש להכפיל את מספר הנדיפיות. יש לטפל בחלקות שאורכן ורוחבן 100 מ' לפחות. לא מומלץ לטפל בתכשיר בחלקות במרחק הקטן מ-100 מטרים מחלקות בהן קיימת אפשרות לנגיעות בסס הנמר ואשר אינן מטופלות בתכשיר לבלבול. קיים חשש שיגיעו לחלקה נקבות מופרות מחלקות סמוכות שאינן מובלבלות. הפחתת המחילות בגזעים תתקבל בצורה מדורגת מהשנה השנייה של שימוש רציף בתכשיר עקב פנולוגיית המזיק ולאחר טיפול מטבי בחלקה. יש לתלות מלכודות ניטור למזיק בחלקה המטופלת. הלכידה במלכודות אילו צריכה להיות אפסית. חובה על פקח מזיקים מורשה לנטר את המזיק בצמחי החלקה וסביבתה, בהתייבשות "עלי דגל" ובנבירות בענפים ובגזעים. בכל מקרה, אין להשתמש במלכודות הניטור בלבד לקביעת רמת הנגיעות בחלקה וספי טיפול שונים. אין לראות בתכשיר אמצעי הדברה בלעדי למזיק, אלא כחלק ממערך ההדברה בחלקה ובמידת הצורך, יש לשלב אמצעי קטילה והדברה נוספים. אין לטפל בחלקות בעלות מדרון של מעל 25%. בחלקות בעלות משטר רוחות מכיוון קבוע, יש להוסיף נדיפיות עד מרחק 20 מטר מהחלקה במעלה הרוח.

בגמר השימוש:

הגנה אישית בגמר העבודה: בגמר תליית הנדיפיות בחלקה יש לרחוץ היטב את הידיים.

אחסון: שמור ואחסן את המתקנים במקום מוגן ונעול, מוצל וקריר, עדיף בקירור או בהקפאה. הימנע ככל האפשר מפתיחת האריזות לפני השימוש.

טיפול באריזות ריקות: יש לאסוף את הנדיפיות מהחלקה ולהשליכן למיכל האשפה.

עזרה ראשונה: במקרה של הרגשת אי נוחות יש לפנות לרופא. במקרה של מגע בעור יש לשטוף במים ובסבון. במקרה מגע בעיניים, יש לשטוף את העיניים במים נקיים למשך מספר דקות. במקרה של גירוי מתמשך בעין יש לפנות לרופא.

מידע לרופא: מספר הטלפון של המרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות: 04-7771900.

הערה: היצרנים והמפיצים אחראים שמוצר זה תואם את המפרט הטכני כמצוין בתווית ומתאים למטרות המצויות על גבי התווית, אך ורק כאשר אופן השימוש בתכשיר נעשה בהתאם להוראות ובתנאי שימוש רגילים. אין להשתמש בתכשיר לשימוש שאינו רשום בתווית לרבות גידולים חסיים שאינם מותרים במפורש בתווית. גידולים שאינם רשומים בתווית, זנים חדשים ותנאי מזג אוויר קיצוניים, היצרן והמפיצים לא יהיו אחראים לנזקים שיגרמו כתוצאה משימוש בתכשיר שלא לפי הוראות תווית זו או בתנאי שימוש בלתי רגילים. במקרים אלה חלה האחריות במלואה על המשתמש בלבד.