

הוראות השימוש

פירוטכניקה CP מיועד לתיקון חוסר ברזל בריסוסי עלווה ללא צורך במשטח. יתרונו הכך שאינו פוצע את העלה. שימוש בפירוטכניקה מיועד לצמחים הסובלים מכלורוזה. כללי: נפח תריסס במטעים 300-50 ליטר לדונם הבתאם לגודל העץ. בשאר הגידולים: רסס פירוטכניקה CP בנפח תריסס כמומלץ, לכיסוי כל חלקי הצמח עד נגיעה. כדי לקבל כיסוי טוב יותר מומלץ להשתמש בפומיות היוצרות טיפות קטנות. יש לדאוג לערבול במיכל המרסס כל עת הריסוס. מומלץ לרסס בשעות הבוקר המוקדמות או לקראת ערב. יש להמנע מריסוס בטמפ' גבוהות, מעל 35°C או בתנאי שרב.

אזהרות אדם: התכשיר מסוכן בבליעה. התכשיר עלול לגרום לריגוש ולגריו קל בעור ובנשימה. התכשיר עלול לגרום לגריו בעיניים.

אזהרות וסכנות לסביבה: התכשיר עלול לגרום לנזק לסביבה מימית. יש להימנע לחלוטין מהגעת התכשיר או מי השטיפה של המרסס לברכות דגים ומקורות מים. התכשיר אינו רעיל לדבורים.

אמצעי זהירות ומיגון: בעת הטיפול יש לנהוג על פי כללי הזהירות בשימוש בחומרי הדברה ולהמנע מבליעה. נשימת הרחף וממגע של החומר עם העור הגלוי והעיניים. אין לשתות, לאכול או לעשן בזמן הטיפול. יש להשתמש במסכה P3 להגנה על דרכי הנשימה. השימוש בבגדי עבודה ארוכים עליהם סרביל עמידות לכימיקלים וגם נעלי עבודה סגורות, כובע, כפפות עמידות לכימיקלים (לפי תקן EN-374/3), משקפי מגן אטומות (לפי תקן EN-166), ומסכת חצי פנים (לפי תקן EN-140) עם מסנן מסוג ABEK-P3 (לפי תקן EN-14387).

אופן הכנת התריסס: מלא את מיכל המרסס עד כדי מחציתו במים, הוסף את הכמות הדרושה של פירוטכניקה CP והשלם את יתרת המים תוך כדי בחישה.

גידול	פגע	מינון	ימי המתנה	הערות
אפרסמון	מחסור בברזל	0.3%	3 ימים	עד נגיעה
מנגו				
עגבניה				
אגוזי אדמה				
פלפל				

* בעצים צעירים אין מיגבלה למועד הריסוס, במרווח של 14 יום.
** לא ליישם בתנאי אקלים קיצוניים או לפניהם.



מכיל: 38% Iron Citrate (SL)

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי
ليس للاستعمال المنزلي - للاستعمال الزراعي

זהירות!

יש לקרוא את תווית לפני השימוש

יש לשמור את המוצר נעול ומוחץ להישג ידם של ילדים
מס. אר"ם: לא מסווג דרגת רעילות: מסוכן IV

מכיל 10 ליטר

מס' אצווה:



בעל הרישוי ומפיץ בעלדי:



ת.ד. 4002 פתח-תחת-הסביבה בע"מ
03-9221550.פקס, 03-9221551
שרות לקוחות: cs@rimi.co.il
www.rimi.co.il

בגמר היישום

ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריית הבתאם להנחיות לסחלוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס לכל חלקיו במים ופחם פעיל או דטרנגנט. את התשטיפים יש לסלק הבתאם להנחיות לסחלוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן הריסוס, במיכל אוסוף או ממתקן אחר על הקרקע, אל בריכות דגים ומקווי מים למניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידי ופינוי לאתר פסולת רעילה ברמת חובב.

הגנה אישית: עם גמר הטיפול יש לרחוץ היטב את הגוף, הפרט את החלקים שהיו גלויים בעת הריסוס ולהחליף בגדים. יש לכבש בנפרד את בגדי העבודה. **כניסה מחדש:** ניתן להיכנס לשטח במטופל לאחר התיבשות מוחלטת של התריסס, כשעה לאחר הריסוס. בבתי ציחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

אחסון: יש לשמור את התכשיר באריזה המקורית במקום סגור, מוצל ונעול המיועד לאחסון חומרי הדברה הרחק ממוצרי מזון ומספוא ומהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. טמפרטורות האחסנה של התכשיר נעות בין 40°C-30°C.

טיפול באריות ריקות: יש לשטוף היטב את האריות ולהוסיף את מי השטיפה למי הריסוס במיכל המרסס. יש לנקב את תחתית ודפנות האריזה הריקה, למעוך ולהשליך לפח האשפה.

עזרה ראשונה: במקרה של הרעלה, כתוצאה משימוש לא נכון בתכשיר, יש להשכיב את הנפגע במקום מוצל ומאוורר ולדאוג לקבלת עזרה מיידית ע"י רופא. במקרה של מגע החומר **בעיניים** יש לשטוף במים זורמים במשך 15 דקות. במידה וישנו גריו מתמשך בעיניים, יש לפנות לרופא המטפל ולהביא את תויות התכשיר.

מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות ביה"ח רמב"ם טלפון 04-7771900.

הודעה: אין להשתמש בתכשיר לשימוש שאינו רשום בתווית לרבות ההגבלות, גידולים שאינם רשומים בתווית, זנים חדשים, בתנאי מזג אויר קיצוניים ובתנאי שימוש בלתי רגילים.